

# Artrodar Gluco®

## Diacereína 25 mg + Sulfato de Glucosamina Potásica 750 mg

Cápsulas

VENTA BAJO RECETA - INDUSTRIA ARGENTINA

### FÓRMULA:

Cada cápsula de Artrodar Gluco® contiene: Diacereína 25 mg, Sulfato de Glucosamina Potásica 750 mg; excipientes: Maltosa, Croscarmelosa Sódica, Povidona, Dióxido de Silicio, Estearato de Magnesio, Alcohol polivinílico, Polietilenglicol, Talco, Dióxido de Titanio, Óxido de hierro amarillo, c.s.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiartrosico.

### POSOLÓGIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Por vía oral 1 o 2 cápsulas con la comida y según sugerencia del médico.

Se aconseja seguir el tratamiento por un lapso de 12 semanas o más. Es aconsejable repetir el tratamiento con un intervalo de dos meses.

### CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Hipersensibilidad individual a la Glucosamina, embarazo, lactancia, fenilcetonuria, insuficiencia renal severa.

### ANTAGONISMOS, ANTIDOTISMO E INTERACCIONES:

La administración oral de Glucosamina Sulfato puede favorecer la absorción gastrointestinal de las tetraciclinas y reducir las de la penicilina y del cloranfenicol cuando son administradas conjuntamente por vía oral.

No existen inconvenientes con la administración simultánea de analgésicos o antiinflamatorios no esteroides.

### ACCIONES COLATERALES Y SECUNDARIAS:

Ocasionalmente, reacciones alérgicas. Eventualmente molestias gastrointestinales (Dolor epigástrico, náuseas, diarreas).

### SOBREDOSIFICACION.

La ingesta voluntaria o accidental de dosis elevadas de Diacereína puede provocar diarrea. No existen antidotos específicos. El tratamiento de emergencia consiste en restaurar el balance hidroelectrolítico, de ser necesario.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse

con los centros de toxicología:

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666.

Hospital Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4658-3001 (int. 1101/1102).

### PRESENTACIÓN.

Envases conteniendo 60 cápsulas.

**Este medicamento debe ser utilizado exclusivamente bajo prescripción y vigilancia médica.**

**CONSERVAR EN SU ENVASE ORIGINAL, ENTRE 15 Y 25°C Y AL ABRIGO DE LA LUZ. MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 38.575.

Elaborado en Plaza 939, (1427) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Directora Técnica: Telma M. Fiandrino, Farmacéutica.

TRB PHARMA S.A. Plaza 939, (1427) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.



**trb pharma s.a.**

FEBRERO 2011

4011-01

